

คาถา 5ย กันสุนัขกัด

- ย1 อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห
- ย2 อย่าเหยียบ ทำให้สุนัขตกใจโมโห
- ย3 อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วย มือเปล่า
- ย4 อย่าหยิบ จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร
- ย5 อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่ มีเจ้าของ



ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด

๑. รีบล้างแผลให้ เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งนานอย่างน้อย ๑๕ นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อ
๒. จดจำลักษณะและสิ่งเกตุอาการสัตว์ที่กัด รวมทั้งสืบหาเจ้าของ เพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
๓. ไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำสมุดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักไปด้วย เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง



เมื่อสุนัขหรือแมวกัด ต้องทำอย่างไร

1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และสบู่ หลายครั้งจนสะอาด
2. จดจำสัตว์ที่กัดไว้ เพื่อสืบหาเจ้าของ กักหมา- แมวไว้ดูอาการ 10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไม่หาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง



โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอกค่างควา ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาท ส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบัน

ยังไม่มียาจะรักษาโรคพิษสุนัข



โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



จัดทำโดยเทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อาการของคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า



คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร?

ในระยะ 2-3 วันแรกอาจมีไข้ต่ำๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหารอ่อนเพลีย คั่นหรือปวดแสบปวดร้อน ตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้งๆที่แผลอาจหายเป็นปกติแล้วต่อไปจะมีอาการ ตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลิ้นเพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนแต่ยังมีสติพูดจารู้เรื่องต่อไปจะอะอะมากขึ้น และสุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต



คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทาง

ใดได้บ้าง?



คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรคคนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทางคือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคนำเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด

2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียจะไม่ ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่า บริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีด ข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกตว่าจะทำให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งถูกเลียที่ ริมฝีปากหรือนัยน์ตา



ข้อควรปฏิบัติ

- นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อสุนัข อายุได้ ๒ - ๔ เดือน และครั้งต่อไปตามที่กำหนดในใบรับรอง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมาย ประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ การขาย หรือให้สุนัขแก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย
- โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเครื่องหมายประจำ และถูกเจ้าหน้าที่จับขัง ๕ วัน ถ้าไม่มีผู้ไปรับจะถูกทำลาย ไม่ปล่อยสัตว์ออกมาในที่สาธารณะ
- เมื่อสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งต่อ สัตว์แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๒๔ ชั่วโมง

